

Informationsblatt Stuten

Trächtigkeitsuntersuchungen mit Ultraschall (rektal):

- 15.- 17. Tag nach Besamung (mögliche Zwillingsträchtigkeit kann festgestellt werden)
- 35. - 42. Tag nach Besamung (falls die Stute nicht aufgenommen hat, aber keine Rosse zeigt, kann dies jetzt noch festgestellt werden, bei Verlust des Embryos ab dem 45. Tag wird die Stute in der gleichen Saison nicht mehr rossig)

Trächtigkeitsuntersuchungen im Blut:

- 18.-19. Tag nach Besamung (Progesteron)
- 45.-100. Tag nach Besamung (PMSG)
- Ab 110. Tag bis ca. 1 Woche vor dem Abfohlen (Oestroneulfat)

Impfungen:

- Influenza/ Tetanus: nicht in den ersten 4 Monaten der Trächtigkeit, optimal 2-4 Wochen vor dem Abfohltermin
- Herpes I: 5. /7. /9. Trächtigkeitsmonat

Entwurmungen oder Kotproben, wie gewohnt, aber:

- Nicht in den ersten 4 Monaten der Trächtigkeit, optimal 2-4 Wochen vor dem Abfohltermin

Fütterung:

- Bis zum 8. Trächtigkeitsmonat normale Fütterung (Erhaltungsbedarf Energie 15280 kcal/500kg/Tag= 64MJ, Proteinbedarf 320g/500kg/Tag)
- Ab dem 8. Trächtigkeitsmonat (Erhaltungsbedarf Energie 19860 kcal/500kg/Tag=83MJ, Proteinbedarf 480g/500kg/Tag):
Heu: 10-12.5kg/ 500kg KG/Tag oder ad libitum (sofern die Stute keine anderweitigen gesundheitlichen Probleme hat, wie z.Bsp. Hufrehe, EMS, starkes Übergewicht o.ä.)
Gras: ad libitum (sofern die Stute keine anderweitigen gesundheitlichen Probleme hat, wie z.Bsp. Hufrehe, EMS, starkes Übergewicht o.ä.)
Mischfutter: 6kg/500kg KG/ Tag mit hohem Eiweissgehalt (15%)
Mineralzusatz (pro 500kg/Tag): hoher Gehalt an Ca (39g), P (26g), Mg (13g), Vit. E (800mg), Selen (1.2mg) wichtig
Evtl. Mash: 2-3x wöchentlich

Bewegung:

- Solange die Stute mag und motiviert ist, kann sie auch bis kurz vor der Geburt geritten/ bewegt werden.

Diverses:

- Stute sollte ca. 4 Wochen vor dem Abfohlen in diejenige Box gebracht werden, in welcher die Geburt stattfinden soll und die Stute mit dem Fohlen sicher auch die erste Zeit verbringt (Immunsystemanpassung an Umgebungskeimflora)
- Hintereisen 2 Wochen vor dem Abfohltermin entfernen
- Allfälligen Caslick (Verschluss der Vagina) wieder öffnen
- Möglichst konstante und stressfreie Haltung und geregelter Tagesablauf in den letzten 4 Wochen vor der Geburt